


EM QUE O APRETUDE SE DIFERENCIA?



O que é APRETUDE?

APRETUDE é um medicamento controlado usado como profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV-1, com o objetivo de reduzir o risco de infecção por HIV-1 em adultos e adolescentes com peso mínimo de pelo menos 35 kg.

» O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O APRETUDE

A primeira profilaxia pré-exposição (PrEP) injetável de longa duração comprovada para reduzir o risco de contrair o HIV



Ajuda a proporcionar dois meses de proteção contínua contra o HIV a cada dose



Comprovadamente superior na redução do risco de contrair o HIV em comparação com o TRUVADA* tomado uma vez ao dia



Entre os estudos mais diversificados sobre PrEP já realizados, estão incluídos homens cisgêneros, mulheres transgêneros e mulheres cisgêneros soronegativas para HIV, além de uma variedade de idades e etnias

O APRETUDE é administrado a cada dois meses por um profissional de saúde após a aplicação de injeções iniciais realizadas com um intervalo de um mês durante dois meses consecutivos. Mantenha-se sob os cuidados de um profissional de saúde enquanto estiver recebendo APRETUDE. Você deve recebê-lo conforme o planejado. Se você perder uma injeção agendada por mais de 7 dias, entre em contato com o seu profissional imediatamente.

* Com base em dois estudos clínicos separados, a transmissão do HIV ocorreu com três vezes menos frequência em homens cisgêneros e mulheres transgêneros, e com 12 vezes menos frequência em mulheres cisgêneros que receberam APRETUDE, em comparação com o recebimento de TRUVADA uma vez ao dia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

O que é mais importante que devo saber sobre o APRETUDE?

Informações importantes para pessoas que recebem o APRETUDE como profilaxia pré-exposição (PrEP) para ajudar a reduzir o risco de contrair o vírus da imunodeficiência humana-1 (HIV-1):

Antes de receber APRETUDE para reduzir o risco de contrair o HIV-1, é necessário que você tenha um resultado negativo para o HIV-1. Não receba o APRETUDE a menos que tenha feito o teste e confirmado como negativo para HIV-1.

» PrEP E PREVENÇÃO AO HIV

Quando o assunto é proteção contra o HIV, a PrEP (profilaxia pré-exposição) é altamente eficaz na prevenção da transmissão do HIV por via sexual, desde que tomada conforme o prescrito.



CONSULTE SEU MÉDICO SOBRE O APRETUDE PARA A PREVENÇÃO DO HIV

O APRETUDE não previne outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Pratique sexo seguro para reduzir o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (continuação)

O que é mais importante que devo saber sobre o APRETUDE? (continuação)

• **Alguns testes para HIV-1 podem não detectar a infecção em pessoas que foram recentemente infectadas.** Informe ao seu profissional de saúde se você teve alguma doença semelhante à gripe no mês anterior ao início ou em qualquer momento durante o recebimento do APRETUDE. Os sintomas de uma nova infecção pelo HIV-1 incluem: cansaço, dores nas articulações ou nos músculos, dor de garganta, erupções cutâneas, inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço ou na virilha, febre, dor de cabeça, vômitos ou diarreia e suor noturno

Enquanto você estiver recebendo APRETUDE para a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV-1:

- O APRETUDE não previne outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Pratique sexo seguro usando preservativos de látex ou poliuretano para reduzir o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis
- Você deve permanecer negativo para HIV-1 para continuar recebendo APRETUDE para PrEP ao HIV-1
- Conheça o seu status em relação ao HIV-1 e o de seus parceiros. Se você acha que foi exposto ao HIV-1, informe imediatamente ao seu profissional de saúde
- O risco de contrair o HIV-1 será menor se os seus parceiros infectados pelo vírus estiverem seguindo um tratamento eficaz

Consulte informações importantes de segurança ao longo deste documento, incluindo um aviso importante e fatos importantes sobre o APRETUDE na página 5.

Acesse o site [APRETUDE.com](https://www.apretude.com) 1

ESTUDOS CLÍNICOS

ENTRE OS ESTUDOS SOBRE PrEP MAIS DIVERSIFICADOS JÁ REALIZADOS

Nesses ensaios clínicos, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um recebeu APREUDE e um placebo de TRUVADA, enquanto o outro recebeu TRUVADA e um placebo de APREUDE. Nem os participantes nem os pesquisadores sabiam qual medicamento estava sendo administrado aos participantes.



Quase 8.000 participantes



Incluindo homens cisgêneros, mulheres transgênero e mulheres cisgêneros não infectados pelo HIV-1 que apresentavam vulnerabilidade comportamental ao HIV.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (continuação)

O que é mais importante que devo saber sobre o APREUDE? (continuação)


Enquanto você estiver recebendo APREUDE para a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV-1: (continuação)

- Faça o teste para HIV-1 a cada injeção de APREUDE ou quando o seu profissional de saúde recomendar. Você não deve deixar de fazer nenhum teste para o HIV-1. Se você for infectado pelo HIV-1 e continuar recebendo APREUDE sem saber que está infectado, o tratamento da infecção pelo HIV-1 pode se tornar mais difícil.
- Faça o teste para outras ISTs. Essas infecções aumentam a probabilidade de você ser infectado pelo HIV-1.
- Fale com o seu profissional de saúde sobre formas de reduzir o risco de contrair o HIV-1.
- Não perca nenhuma injeção do APREUDE. Perder as injeções aumenta o risco de contrair o vírus HIV-1.

Quem não deve receber APREUDE?

Não receba APREUDE se:

- **já tem HIV-1 ou não sabe qual é o seu status em relação ao HIV-1.** Se você for soropositivo para o HIV-1, será necessário tomar outros medicamentos para tratar a infecção. O APREUDE só pode ajudar a reduzir o risco de infecção pelo HIV-1 **before** você seja infectado. **Se você tem HIV-1 e recebe apenas APREUDE, com o tempo, o tratamento do seu HIV-1 pode se tornar mais difícil.**
- é alérgico ao cabotegravir
- está tomando alguns medicamentos: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína e rifampicina ou rifapentina



ESTUDO 1

4.566 HOMENS CISGÊNEROS, MULHERES TRANSGÊNEROS E PESSOAS EM RISCO DE CONTRAIR HIV QUE NÃO SÃO PORTADORES DO HIV-1.

ESTUDO 2

3.244 MULHERES CISGÊNEROS SORONEGATIVAS PARA HIV-1 CORREM RISCO DE CONTRAIR HIV.

VEJA OS RESULTADOS: Vá para a próxima página.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (CONTINUAÇÃO)

Quais são os possíveis efeitos colaterais do APREUDE?

O APREUDE pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:


- **Reações alérgicas.** Entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente, se desenvolver uma erupção cutânea com APREUDE. **Pare de administrar APREUDE e obtenha ajuda médica imediatamente, se desenvolver uma erupção cutânea com qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas:** Febre; sensação de mal-estar geral; cansaço; dores musculares ou articulares; dificuldade para respirar; bolhas ou feridas na boca; bolhas, vermelhidão ou inchaço dos olhos; inchaço da boca, rosto, lábios ou língua.
- **Problemas hepáticos.** Problemas hepáticos ocorreram em pessoas com ou sem histórico de problemas hepáticos ou outros fatores de risco. **Entre em contato com o seu profissional de saúde imediatamente se você desenvolver qualquer um dos seguintes sintomas:** A pele ou a parte branca dos olhos fica amarela (icterícia); urina escura ou "cor de chá"; fezes claras (evacuação); náusea ou vômito; perda de apetite; dor, desconforto ou sensibilidade no lado direito da região abdominal; coceira.
- **Depressão ou mudanças de humor.** Se você apresentar algum dos seguintes sintomas, entre em contato com seu profissional de saúde ou procure ajuda médica de emergência imediatamente: sentir-se triste ou desanimado; sentir-se ansioso ou inquieto; ter pensamentos de se machucar (suicídio) ou ter tentado se machucar.

Consulte informações importantes de segurança ao longo deste documento, incluindo um aviso importante e fatos importantes sobre o APREUDE na [página 5](#).


Acesse o site [APREUDE.com](https://www.apretude.com) 2

RESULTADOS DO ESTUDO 1

» DURANTE O ESTUDO, MAIS PESSOAS MANTIVERAM RESULTADOS NEGATIVOS PARA O HIV AO USAR O APREUDE EM COMPARAÇÃO COM O TRUVADA




Os participantes receberam o produto por um período médio de 1,3 anos.
Os resultados podem variar.




* Ao final do estudo, os participantes tiveram a opção de continuar o estudo com APREUDE ou TRUVADA. Dos 1.698 participantes inicialmente incluídos nos Estados Unidos, 803 (47%) tinham dados sobre suas escolhas disponíveis. Pessoas que preferem uma opção de PrEP em forma oral podem ter optado por não participar do estudo.

RESULTADOS DO ESTUDO 2

» DURANTE O ESTUDO, MAIS MULHERES MANTIVERAM RESULTADOS NEGATIVOS PARA HIV AO RECEBER APREUDE EM COMPARAÇÃO COM O TRUVADA.



Os participantes receberam o produto por um período médio de 1,3 anos.
Os resultados podem variar.



[†] Ao final do estudo, os participantes tiveram a opção de continuar o tratamento com APREUDE ou TRUVADA. Dos 3.028 pacientes incluídos no estudo, 2.472 (81%) tinham dados sobre suas escolhas disponíveis. Pessoas que preferem uma opção de PrEP em forma oral podem ter optado por não participar do estudo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (continuação)

Quais são os possíveis efeitos colaterais do APREUDE? (continuação)

Os efeitos colaterais mais comuns de APREUDE incluem:

- Dor, sensibilidade, presença de um nódulo ou caroço endurecido, inchaço, hematomas, vermelhidão, coceira, calor, perda de sensibilidade no local da injeção, abscesso, descoloração; diarreia; dor de cabeça; febre; cansaço; problemas para dormir; náusea; tontura; liberação de gases; dor abdominal; vômitos; dores musculares; erupções cutâneas; perda de apetite; sonolência; dor nas costas; ou infecção do trato respiratório superior
- Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do APREUDE. Consulte o seu profissional de saúde para obter aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (CONTINUAÇÃO)

Antes de receber APREUDE, informe o seu profissional de saúde sobre todos os seus problemas médicos, incluindo se você:

- já teve uma erupção cutânea ou uma reação alérgica a medicamentos que contêm cabotegravir.
- tem ou alguma vez teve problemas renais.
- já teve problemas de saúde mental.
- está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se o APREUDE irá prejudicar o seu feto. O APREUDE pode permanecer no seu corpo por até 12 meses ou mais após a última injeção. Informe ao seu profissional de saúde se você engravidar durante ou após receber APREUDE.
- está amamentando ou planeja amamentar. O APREUDE pode passar para o leite materno. Converse com o seu profissional de saúde sobre a melhor forma de alimentar o seu bebê durante ou após receber APREUDE.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

Consulte informações importantes de segurança ao longo deste documento, incluindo um aviso importante e fatos importantes sobre o APREUDE na [página 5](#).

Acesse o site [APREUDE.com](https://www.apretude.com) 3

CUSTO E SUPORTE

» ENTENDA SUA COBERTURA E SEUS BENEFÍCIOS

Antes da sua primeira consulta ou prescrição, entre em contato com a ViiVConnect para saber mais sobre a sua cobertura de seguro. Quando você descobre que o APREUDE é a escolha certa para você, entender seus benefícios pode ajudá-lo a definir os próximos passos.

PrEP E SEGURO

A legislação federal exige que os planos de saúde cubram determinados itens e serviços relacionados à PrEP. Entre em contato com a sua seguradora para saber como isso pode afetar você.

» ECONOMIA DE APREITUDE

É possível obter descontos na prescrição do APREUDE através do Programa de Coparticipação ViiVConnect. **Pacientes elegíveis podem até não pagar nenhum valor por injeção, ou seja, sem custos adicionais.** Se você for elegível, não se esqueça de fornecer os detalhes do seu programa de coparticipação ao seu profissional de saúde ou à farmácia.

Sujeito a elegibilidade, termos e condições do programa. Os programas ViiVConnect não constituem seguro de saúde. Há restrições aplicáveis.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (continuação)

Antes de receber APREUDE, informe o seu profissional de saúde sobre todos os seus problemas médicos, incluindo se você: (continuação)

Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que toma, incluindo medicamentos de prescrição e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos.

- Alguns medicamentos podem interagir com o APREUDE. Mantenha uma lista dos seus medicamentos e mostre-os ao seu profissional de saúde e farmacêutico. **Não comece a tomar um novo medicamento sem informar o seu profissional de saúde**

Como receberei o APREUDE?

- O APREUDE será administrado a você na forma de injeção pelo seu profissional de saúde.
- O APREUDE é inicialmente administrado por meio de uma injeção intramuscular na nádega, uma vez por mês durante os dois primeiros meses, e depois uma vez a cada dois meses.
- Antes de receber as suas primeiras injeções de APREUDE, o seu profissional de saúde pode fazer com que tome 1 comprimido oral de cabotegravir uma vez por dia durante 1 mês (pelo menos 28 dias) para avaliar como você tolera cabotegravir.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

» ENTRE EM CONTATO COM O ViiVCONNECT PARA CONVERSAR COM UM REPRESENTANTE AO VIVO E OBTER AJUDA PERSONALIZADA.



Serviços para ajudá-lo a ter acesso ao medicamento prescrito pela ViiV.



Ligue para um Coordenador de Acesso no número

1-844-588-3288 (ligação gratuita) de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h (horário do leste dos EUA).



Visite o site **ViiVConnect.com**

para obter suporte e recursos.

Sujeito a elegibilidade, termos e condições do programa. Os programas ViiVConnect não constituem seguro de saúde.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (continuação)

Como receberei o APREUDE? (continuação)

- O APREUDE é um medicamento de longa duração e pode permanecer no seu corpo por 12 meses ou mais após a última injeção.
- Fique sob os cuidados de um profissional de saúde enquanto recebe o APREUDE. É fundamental que você receba o APREUDE conforme o cronograma estabelecido.
- Se você perder ou planeja perder uma injeção de APREUDE programada em mais de 7 dias, ligue imediatamente para o seu profissional de saúde para discutir suas opções de PrEP.
- Se você parar de receber o APREUDE, converse com seu profissional de saúde sobre outras opções para reduzir o risco de contrair o HIV-1.

Você é incentivado a relatar efeitos colaterais negativos de medicamentos prescritos para a FDA. Visite

www.fda.gov/medwatch ou ligue para 1-800-FDA-1088.

Você também pode relatar efeitos colaterais negativos para a ViiV em gsk.public.reportum.com ou 1-877-844-8872.

Leia as Informações do Paciente do APREUDE, incluindo um Aviso Importante, e discuta-as com seu profissional de saúde.

TRUVADA is owned by Gilead Sciences, Inc. All other trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies



©2026 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBTBROC260011_PORT July 2026
Produced in USA.

Consulte informações importantes de segurança ao longo deste documento, incluindo um aviso importante e fatos importantes sobre o APREUDE na página 5.

Acesse o site APREUDE.com 4

Fatos importantes sobre o APRETUDE

Este é apenas um breve resumo de informações importantes sobre o APRETUDE e não substitui falar com seu profissional de saúde sobre seu medicamento.

AP-reh-tood

AS INFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES SOBRE O APRETUDE

Informações importantes para pessoas que recebem o APRETUDE como profilaxia pré-exposição (PrEP) para ajudar a reduzir o risco de contrair o vírus da imunodeficiência humana-1 (HIV-1):

Antes de receber APRETUDE para reduzir o risco de contrair o HIV-1:

- **Você precisa ter um resultado negativo para HIV-1 para começar a receber o APRETUDE. Você precisa fazer o teste para garantir que não está infectado pelo HIV-1.**
- **Não receba o APRETUDE para profilaxia pré-exposição ao HIV-1 (PrEP) a menos que tenha sido confirmado que você é negativo para HIV-1.**
- Alguns testes para HIV-1 podem não detectar a infecção em pessoas que foram recentemente infectadas. Se você apresentar sintomas semelhantes aos da gripe, pode ter sido infectado recentemente pelo HIV-1. Informe ao seu profissional de saúde se você teve alguma doença semelhante à gripe no mês anterior ao início ou em qualquer momento durante o recebimento do APRETUDE. Os sintomas de uma nova infecção pelo HIV-1 incluem: cansaço, dores nas articulações ou nos músculos, dor de garganta, erupções cutâneas, inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço ou na virilha, febre, dor de cabeça, vômitos ou diarreia e suor noturno.

Enquanto você estiver recebendo APRETUDE para a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV-1:

- **O APRETUDE não previne outras infecções sexualmente transmissíveis. Para reduzir o risco de contrair essas infecções, pratique sexo seguro usando preservativos de látex ou poliuretano.**
- **Para continuar recebendo o APRETUDE como profilaxia pré-exposição ao HIV-1, é essencial que você mantenha um resultado negativo para o vírus.**
 - Conheça o seu status em relação ao HIV-1 e o de seus parceiros.
 - Pergunte aos seus parceiros que têm HIV-1 se eles estão tomando medicamentos contra o HIV-1 e se possuem uma carga viral indetectável. Uma carga viral indetectável ocorre quando a quantidade de vírus presente no sangue é tão baixa que não pode ser medida por meio de um exame laboratorial. Para manter uma carga viral indetectável, é essencial que seus parceiros continuem tomando a medicação para o HIV-1 conforme prescrito. O risco de contrair o HIV-1 é menor se os seus parceiros infectados pelo vírus estiverem seguindo um tratamento eficaz.
 - Faça o teste para HIV-1 a cada injeção de APRETUDE ou quando o seu profissional de saúde recomendar. Você não deve deixar de fazer nenhum teste para o HIV-1. Se você for infectado pelo HIV-1 e continuar recebendo APRETUDE sem saber que está infectado, o tratamento da infecção pelo HIV-1 pode se tornar mais difícil.
 - Faça exames para detectar outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, clamídia e gonorréia. Essas infecções aumentam a vulnerabilidade do seu organismo ao HIV-1.
 - Se você acha que foi exposto ao HIV-1, informe imediatamente ao seu profissional de saúde. Eles podem querer realizar mais exames para confirmar que você ainda é negativo para o HIV-1.
 - Obtenha informações e apoio para ajudar a reduzir comportamentos de risco sexual.
 - Não perca nenhuma injeção do APRETUDE. Perder as injeções aumenta o risco de contrair o vírus HIV-1.
 - Se você for diagnosticado como positivo para HIV-1, será necessário tomar outros medicamentos para tratar a infecção. O APRETUDE não é aprovado para o tratamento do HIV-1.

Se você tem HIV-1 e recebe apenas APRETUDE, com o tempo o vírus pode se tornar mais difícil de tratar.

SOBRE O APRETUDE

APRETUDE é um medicamento controlado usado como profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV-1, com o objetivo de reduzir o risco de infecção pelo vírus em adultos e adolescentes com peso mínimo de pelo menos 35 kg. O HIV-1 é o vírus que causa a Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Não se sabe se o APRETUDE é seguro e eficaz em crianças com menos de 12 anos de idade ou pesando menos de 77 lbs (35 kg).

NÃO RECEBA APRETUDE SE VOCÊ

- **Já possui infecção pelo HIV-1.** Se você for soropositivo para HIV-1, será necessário tomar outros medicamentos para tratar a infecção. O APRETUDE não é aprovado para o tratamento do HIV-1.
- **Você não sabe qual é o seu estado de infecção pelo HIV-1.** Você pode já ser soropositivo para o HIV-1. Você precisa tomar outros medicamentos para tratar o HIV-1. O APRETUDE só pode ajudar a reduzir o risco de infecção pelo HIV-1 **antes** que você seja infectado.
- é alérgico ao cabotegravir.
- está tomando algum dos seguintes medicamentos: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou rifapentina.

ANTES DE RECEBER O APRETUDE

Informe o seu profissional de saúde sobre todos os seus problemas médicos, incluindo se você:

- já teve uma erupção cutânea ou uma reação alérgica a medicamentos que contêm cabotegravir.
- tem ou alguma vez teve problemas renais.
- já teve problemas de saúde mental.
- está grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se o APRETUDE irá prejudicar o seu feto. O APRETUDE pode permanecer no seu corpo por até 12 meses ou mais após a última injeção. Informe ao seu profissional de saúde se você engravidar durante ou após receber APRETUDE.
- está amamentando ou planeja amamentar. O APRETUDE pode passar para o leite materno. Converse com o seu profissional de saúde sobre a melhor forma de alimentar o seu bebê durante ou após receber APRETUDE.

Informe o seu profissional de saúde sobre todos os medicamentos que toma, incluindo medicamentos de prescrição e de venda livre, vitaminas e suplementos fitoterápicos. Alguns medicamentos podem interagir com o APRETUDE. Mantenha uma lista dos seus medicamentos e mostre-os ao seu profissional de saúde e farmacêutico quando adquirir um novo medicamento. Pode pedir ao seu profissional de saúde ou farmacêutico uma lista de medicamentos que interagem com o APRETUDE.

Não comece a tomar um novo medicamento sem informar o seu profissional de saúde. O seu profissional de saúde pode dizer-lhe se é seguro receber APRETUDE com outros medicamentos.

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS DE APRETUDE

O APRETUDE pode causar efeitos colaterais graves, incluindo:

- **Reações alérgicas.** Entre em contato com seu profissional de saúde imediatamente, se desenvolver uma erupção cutânea com APRETUDE. **Para administrar APRETUDE e obtenha ajuda médica imediatamente, se desenvolver uma erupção cutânea com qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas:** Febre; sensação de mal-estar geral; cansaço; dores musculares ou articulares; dificuldade para respirar; bolhas ou feridas na boca; bolhas, vermelhidão ou inchaço dos olhos; inchaço da boca, rosto, lábios ou língua.
- **Problemas hepáticos.** Problemas hepáticos ocorreram em pessoas com ou sem histórico de problemas hepáticos ou outros fatores de risco. Seu profissional de saúde pode fazer exames de sangue para verificar a função hepática. **Entre em contato com o seu profissional de saúde imediatamente se você desenvolver qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas de problemas hepáticos:** A pele ou a parte branca dos olhos fica amarela (icterícia); urina escura ou “cor de chá”; fezes claras (evacuação); náusea ou vômito; perda de apetite; dor, desconforto ou sensibilidade no lado direito da região abdominal; coceira.
- **Depressão ou mudanças de humor.** Se você apresentar algum dos seguintes sintomas, entre em contato com seu profissional de saúde ou procure ajuda médica imediatamente: sentir-se triste ou desanimado; sentir-se ansioso ou agitado; ter pensamentos de se machucar (suicídio) ou ter tentado se machucar.

Os efeitos colaterais mais comuns do APRETUDE incluem: dor, sensibilidade, formação de nódulos ou caroços endurecidos, inchaço, hematomas, vermelhidão, coceira, calor, perda de sensibilidade no local da injeção, abscessos, descoloração; diarreia; dor de cabeça; febre; cansaço; problemas para dormir; náusea; tontura; liberação de gases; dor abdominal; vômitos; dores musculares; erupções cutâneas; perda de apetite; sonolência; dor nas costas; infecção do trato respiratório superior.

Estes não são todos os efeitos colaterais possíveis do APRETUDE.

Consulte o seu médico para obter aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais. Você pode relatar efeitos colaterais à FDA em 1-800-FDA-1088.

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES

- Fale com o seu profissional de saúde ou farmacêutico.
- Vá para APRETUDE.com ou ligue para 1-877-844-8872, onde você também pode obter o rótulo aprovado pela FDA.

September 2024 APR:4PIL

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2025 ViiV Healthcare or licensor.

PMUS-CBTBRFS240003_PORT January 2025 Produced in USA.
0002-0035-01