

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПРЕПАРАТА «APRETUDE»?

Что представляет собой APRETUDE?

APRETUDE — это рецептурный препарат, который применяется для доконтактной профилактики (ДКП) с целью снижения риска инфицирования вирусом иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1) у взрослых и подростков с массой тела не менее 35 кг (77 фунтов).

» ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О ПРЕПАРАТЕ «APRETUDE»

Первый инъекционный препарат длительного действия для ДКП, с доказанной эффективностью снижающий риск заражения ВИЧ.



Обеспечивает непрерывную защиту от ВИЧ на протяжении 2 месяцев после каждой инъекции



Доказанное превосходство в снижении риска заражения ВИЧ по сравнению с препаратом ТРУВАДА, принимаемым один раз в день*



Одни из наиболее разнообразных по составу испытуемых исследований ДКП: с участием трансгендерных мужчин, трансгендерных женщин и трансгендерных женщин самого разного возраста и этнической принадлежности с отрицательным ВИЧ-статусом

Препарат APRETUDE вводится медицинским работником, причем первые 2 инъекции проводятся с интервалом в 1 месяц, а последующие — один раз в два месяца. В период применения препарата APRETUDE необходимо находиться под медицинским наблюдением. Инъекции должны проводиться строго по графику. Если вы задерживаетесь с очередной инъекцией более чем на 7 дней, сразу же сообщите об этом своему врачу.

* По результатам 2 независимых клинических исследований, в которых при применении препарата APRETUDE заражение ВИЧ у трансгендерных мужчин и трансгендерных женщин происходило в 3 раза реже, а у трансгендерных женщин — в 12 раз реже, чем при приеме препарата ТРУВАДА один раз в день.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Что в первую очередь следует знать о препарате APRETUDE?

Важная информация для лиц, получающих препарат APRETUDE для доконтактной профилактики (ДКП) с целью снижения риска инфицирования вирусом иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1):

Прежде чем начать применять APRETUDE для снижения риска заражения ВИЧ-1, необходимо подтвердить отсутствие ВИЧ-1 в организме. Не начинайте применять APRETUDE до тех пор, пока не пройдете тест на ВИЧ-1 и не подтвердите отрицательный ВИЧ-статус.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

» ДКП И ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Когда речь идет о защите от ВИЧ, доконтактная профилактика (ДКП) чрезвычайно эффективно предотвращает передачу ВИЧ половым путем при условии соблюдения всех назначений врача.



УЗНАЙТЕ У ВРАЧА О ПРЕПАРАТЕ «APRETUDE» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

APRETUDE не защищает от других инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Для снижения риска возникновения ИППП используйте эффективные методы контрацепции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

Что в первую очередь следует знать о препарате APRETUDE? (продолжение)

• **Некоторые тесты на ВИЧ-1 могут не показывать наличие инфекции ВИЧ-1, если человек заразился недавно.** Если у вас были гриппоподобные симптомы в течение месяца до начала инъекций или в период применения препарата APRETUDE, сообщите об этом своему врачу. К ранним симптомам инфекции ВИЧ-1 относятся: утомляемость; боль в мышцах или суставах; боль в горле; сыпь; увеличение шейных или паховых лимфоузлов; лихорадка; головная боль; рвота или диарея; ночная потливость.

В период применения препарата APRETUDE для доконтактной профилактики (ДКП) заражения ВИЧ-1:

• **APRETUDE не защищает от других инфекций, передающихся половым путем (ИППП).** Для снижения риска возникновения ИППП используйте эффективные методы контрацепции, например латексные или полиуретановые презервативы.

• **Чтобы вы могли продолжать применять APRETUDE для ДКП заражения ВИЧ-1, статус ВИЧ-1 у вас должен оставаться отрицательным.**

- Узнайте свой статус ВИЧ-1 и статус ВИЧ-1 своих партнеров. Если вы считаете, что могли заразиться ВИЧ-1, сразу же сообщите об этом своему врачу.
- Риск заражения ВИЧ-1 ниже, если ваши партнеры с инфекцией ВИЧ-1 получают эффективное лечение.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОДНИ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ПО СОСТАВУ ИССЛЕДОВАНИЙ ДКП

В этих клинических исследованиях участникам случайным образом назначали либо APRETUDE и плацебо, имитирующее препарат ТРУВАДА, либо препарат ТРУВАДА и плацебо, имитирующее APRETUDE. Ни сами участники, ни исследователи не знали, какие препараты они получают.



Около 8000 участников



Включая трансгендерных мужчин, трансгендерных женщин и трансгендерных женщин с отрицательным статусом ВИЧ-1 и поведенческим риском заражения ВИЧ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

Что в первую очередь следует знать о препарате APRETUDE? (продолжение)

В период применения препарата APRETUDE для доконтактной профилактики (ДКП) заражения ВИЧ-1 (продолжение):

- Проходите тест на ВИЧ-1 перед каждой инъекцией препарата APRETUDE или по указанию своего врача. Нельзя пропускать ни одного теста на ВИЧ-1. Если вы заразитесь ВИЧ-1 и, не зная об этом, продолжите получать APRETUDE, вирус может стать устойчивым к лечению.
- Проходите тесты на другие ИППП. При наличии этих инфекций легче заразиться ВИЧ-1.
- Обсудите со своим врачом возможные способы снижения риска заражения ВИЧ-1.
- Не пропускайте ни одной инъекции препарата APRETUDE. Пропуск инъекций повышает риск заражения ВИЧ-1.

Кому не следует применять APRETUDE?

Не применяйте препарат APRETUDE в следующих случаях:

- Если вы уже заражены ВИЧ-1 или не знаете, есть ли у вас ВИЧ-1. Если у вас обнаружили ВИЧ-1, вам нужно принимать другие препараты для лечения инфекции ВИЧ-1. Препарат APRETUDE позволяет снизить риск заражения ВИЧ-1, только если его применять до момента инфицирования. Если вы заражены ВИЧ-1 и применяете только APRETUDE, со временем вирус может стать устойчивым к лечению.
- Если у вас аллергия на каботегравир.
- Если вы принимаете некоторые препараты: карбамазепин, окскарбазепин, фенobarбитал, фенитоин, рифампин или рифапентин.

ИССЛЕДОВАНИЕ 1

4566 ЦИСГЕНДЕРНЫХ МУЖЧИН, ТРАНСГЕНДЕРНЫХ ЖЕНЩИН И ДРУГИХ ЛИЦ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ ВИЧ-1 И РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ

ИССЛЕДОВАНИЕ 2

3244 ЦИСГЕНДЕРНЫЕ ЖЕНЩИНЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ ВИЧ-1 И РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ

СМ. РЕЗУЛЬТАТЫ: продолжение на след. странице

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)


КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА APRETUDE?

У препарата APRETUDE могут быть серьезные побочные эффекты:


- **Аллергические реакции.** Если при применении препарата APRETUDE у вас появится сыпь, сразу же обратитесь к врачу. **Прекратите применение препарата APRETUDE и сразу же обратитесь за медицинской помощью при появлении сыпи в сочетании с любыми из следующих признаков или симптомов:** лихорадка; общее недомогание; утомляемость; боль в мышцах или суставах; затрудненное дыхание; волдыри или язвочки во рту; волдыри на коже; покраснение или отеки глаз; отеки во рту; отеки лица, губ или языка.
- **Проблемы с печенью.** Проблемы с печенью возникали как при наличии, так и при отсутствии в прошлом проблем с печенью или других факторов риска. **Сразу же обратитесь к своему врачу при возникновении любого из следующих симптомов:** пожелтение кожи или белков глаз; темная моча (цвета крепкого чая); светлый стул; тошнота или рвота; потеря аппетита; боль, ноющие или болезненные ощущения в правой части живота; зуд.
- **Депрессия или перепады настроения.** Сразу же обратитесь к своему врачу или в отделение неотложной медицинской помощи при возникновении любого из следующих симптомов: чувство печали или отчаяния; чувство тревоги или беспокойства; мысли о причинении себе вреда (суициде) или попытки причинения себе вреда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 1

» В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «APRETUDE» ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВИЧ-СТАТУС СОХРАНЯЛСЯ У БОЛЬШЕГО ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ, ЧЕМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТА «ТРУВАДА»




Медиана продолжительности применения препарата составила 1,3 года.
Результаты могут различаться.




* По окончании этого этапа исследования его участникам предоставлялся выбор, какой препарат принимать на следующем этапе — APRETUDE или ТРУВАДА. Из 1698 участников, изначально включенных в исследование в США, в опросе приняли участие 803 человека (47 %). Лица, которые предпочли для ДКП пероральный препарат, могли отказаться от участия в исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2

» В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «APRETUDE» ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВИЧ-СТАТУС СОХРАНЯЛСЯ У БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЖЕНЩИН, ЧЕМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТА «ТРУВАДА»



Медиана продолжительности применения препарата составила 1,3 года.
Результаты могут различаться.



† По окончании этого этапа исследования его участникам предоставлялся выбор, какой препарат принимать на следующем этапе — APRETUDE или ТРУВАДА. Из 3028 участников исследования в опросе приняли участие 2472 человека (81 %). Лица, которые предпочли для ДКП пероральный препарат, могли отказаться от участия в исследовании.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

Каковы возможные побочные эффекты препарата APRETUDE? (продолжение)

Наиболее частые побочные эффекты препарата APRETUDE:

- Боль, болезненные ощущения, уплотнение или шишка, отек, кровоподтек, покраснение, зуд, ощущение тепла, потеря чувствительности, абсцесс или изменение цвета кожи в месте инъекции; диарея; головная боль; лихорадка; утомляемость; проблемы со сном; тошнота; головокружение; метеоризм; боль в животе; рвота; боли в мышцах; сыпь; потеря аппетита; сонливость; боли в спине; инфекция верхних дыхательных путей.
- Это не все возможные побочные эффекты препарата APRETUDE. За медицинскими рекомендациями по поводу побочных эффектов обращайтесь к своему врачу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)

Прежде чем начать применять препарат APRETUDE, сообщите своему врачу обо всех имеющихся у вас заболеваниях и других важных обстоятельствах, включая следующее:

- Была ли у вас когда-либо кожная сыпь или аллергическая реакция при применении препаратов, содержащих каботегравир.
- Есть ли у вас сейчас или были ли раньше проблемы с печенью.
- Были ли у вас когда-либо психические расстройства.
- Беременны ли вы или планируете ли забеременеть. Неизвестно, может ли APRETUDE нанести вред вашему будущему ребенку. APRETUDE может оставаться в организме до 12 месяцев с момента последней инъекции и даже дольше. Если вы забеременеете в период применения препарата APRETUDE или позже, сообщите об этом своему врачу.
- Кормите ли вы грудью или планируете ли это делать в будущем. APRETUDE может проникать в грудное молоко. Обсудите со своим врачом, как лучше кормить ребенка во время или после применения препарата APRETUDE.

РАСХОДЫ И ПОДДЕРЖКА

» УЗНАЙТЕ ОБ УСЛОВИЯХ СВОЕГО СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ И ЛЬГОТАХ

Прежде чем прийти на первый прием или приобрести лекарство по рецепту, уточните условия своего страхового покрытия, обратившись в службу ViiVConnect. Как только вы поймете, что препарат APRETUDE вам подходит, проверка страховых льгот поможет вам определить дальнейшие шаги.

ДКП И СТРАХОВКА

Согласно федеральному законодательству программы страхования должны покрывать расходы на определенные товары и услуги, связанные с ДКП. Обратитесь в свою страховую компанию, чтобы узнать, как это может отразиться на вас.

» СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА «APRETUDE»

Вы можете уменьшить расходы на назначенный вам препарат APRETUDE с помощью программы софинансирования ViiVConnect. **Пациенты, отвечающие определенным требованиям, могут даже ничего не доплачивать за инъекции.** Если вы отвечаете этим требованиям, обязательно передайте данные о своем участии в программе софинансирования своему врачу или фармацевту.

Для участия в программе необходимо соответствовать определенным критериям, а также соблюдать ее условия и положения. Программы ViiVConnect не заменяют собой программы медицинского страхования. Имеются ограничения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прежде чем начать применять препарат APRETUDE, сообщите своему врачу обо всех имеющихся у вас заболеваниях и других важных обстоятельствах, включая следующее: (продолжение)

Сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки.

- Некоторые лекарства могут взаимодействовать с препаратом APRETUDE. Составьте список принимаемых вами лекарств и показывайте его своему врачу и фармацевту. **Не начинайте принимать новое лекарство, не сообщив об этом своему врачу.**

Каков способ применения препарата APRETUDE?

- Препарат APRETUDE вводится медицинским работником путем инъекции.
- Препарат APRETUDE вводится в ягодичную мышцу, причем первые 2 месяца инъекции делаются 1 раз в месяц, а затем — 1 раз в 2 месяца.
- Перед первой инъекцией препарата APRETUDE ваш врач может назначить вам каботегравир в таблетках — по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1 месяца (не менее 28 дней), чтобы оценить, как вы переносите препарат.

» ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ViiVCONNECT, ЧТОБЫ ПООБЩАТЬСЯ В ЧАТЕ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

ViiVConnect

Помощь в получении назначенного вам препарата компании ViiV



Позвоните координатору программы по бесплатному номеру 1-844-588-3288

(понедельник–пятница, с 08:00 до 20:00 по восточному времени)



Посетите веб-сайт ViiVConnect.com, чтобы получить помощь и полезные материалы

Для участия в программе необходимо соответствовать определенным критериям, а также соблюдать ее условия и положения. Программы ViiVConnect не заменяют собой программы медицинского страхования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Каков способ применения препарата APRETUDE? (продолжение)

- APRETUDE — это препарат длительного действия, который может оставаться в организме 12 месяцев с момента последней инъекции и даже дольше.
- В период применения препарата APRETUDE необходимо находиться под медицинским наблюдением. Важно, чтобы инъекции препарата APRETUDE проводились строго по графику.
- Если вы пропустили очередную инъекцию препарата APRETUDE или понимаете, что задержитесь с ней более чем на 7 дней, сразу же сообщите об этом своему врачу, чтобы обсудить доступные способы ДКП.
- В случае прекращения применения препарата APRETUDE обсудите со своим врачом другие способы снижения риска заражения ВИЧ-1.

Просим вас сообщать о нежелательных побочных эффектах рецептурных препаратов в Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Оставьте сообщение на веб-сайте www.fda.gov/medwatch или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088.

Вы также можете сообщить о нежелательных побочных эффектах в компанию ViiV на веб-сайте gsk.publicreportum.com или по телефону 1-877-844-8872.

Изучите предназначенную для пациентов информацию о препарате APRETUDE, включая важные предупреждения, и обсудите ее со своим врачом.

TRUVADA is owned by Gilead Sciences, Inc. All other trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies



©2026 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBTBROC260009_RUSS July 2026
Produced in USA.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

Важную информацию по безопасности, включая важные предупреждения и важные факты о препарате APRETUDE, можно найти на [стр. 5](#).

Посетите веб-сайт APRETUDE.com 4

Важные факты о препарате APRETUDE

В настоящем документе содержатся только основные сведения о препарате APRETUDE, которые не могут заменить собой консультацию врача по поводу вашего лечения.

AP-reh-tood

НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ «APRETUDE»

Важная информация для лиц, получающих препарат APRETUDE для доконтактной профилактики (ДКП) с целью снижения риска инфицирования вирусом иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1):

Прежде чем начать применять APRETUDE для снижения риска заражения ВИЧ-1:

- **Необходимо подтвердить отсутствие ВИЧ-1 в организме, чтобы вам назначили APRETUDE. Вы должны пройти тест, позволяющий убедиться, что вы не заражены ВИЧ-1.**
- **Не начинайте применять APRETUDE для ДКП заражения ВИЧ-1, пока не подтвердите отсутствие ВИЧ-1 в организме.**
- Некоторые тесты на ВИЧ-1 могут не показывать наличие инфекции ВИЧ-1, если человек заразился недавно. Если у вас есть гриппоподобные симптомы в течение месяца до начала инъекций или в период применения препарата APRETUDE, сообщите об этом своему врачу. К ранним симптомам инфекции ВИЧ-1 относятся: утомляемость; боль в мышцах или суставах; боль в горле; сыпь; увеличение шейных или паховых лимфоузлов; лихорадка; головная боль; рвота или диарея; ночная потливость.

В период применения препарата APRETUDE для доконтактной профилактики (ДКП) заражения ВИЧ-1:

- **Препарат APRETUDE не защищает от других инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Для снижения риска возникновения инфекций, передающихся половым путем, используйте эффективные методы контрацепции, например латексные или полиуретановые презервативы.**
- **Чтобы вы могли продолжать применять APRETUDE для ДКП заражения ВИЧ-1, статус ВИЧ-1 у вас должен оставаться отрицательным.**
 - Узнайте свой статус ВИЧ-1 и статус ВИЧ-1 своих партнеров.
 - Узнайте у своих партнеров с ВИЧ-1, принимают ли они препараты для лечения инфекции ВИЧ-1 и подтверждено ли у них отсутствие вирусной нагрузки. Отсутствие вирусной нагрузки означает, что количество вирусных частиц в крови слишком мало, чтобы их можно было обнаружить с помощью лабораторных тестов. Чтобы поддерживать отсутствие вирусной нагрузки, ваши партнеры должны продолжать принимать препараты для лечения инфекции ВИЧ-1 согласно врачебным предписаниям. Риск заражения ВИЧ-1 ниже, если ваши партнеры с инфекцией ВИЧ-1 получают эффективное лечение.
 - Проходите тест на ВИЧ-1 перед каждой инъекцией препарата APRETUDE или по указанию своего врача. Нельзя пропускать ни одного теста на ВИЧ-1. Если вы заразитесь ВИЧ-1 и, не зная об этом, продолжите получать APRETUDE, вирус может стать устойчивым к лечению.
 - Пройдите тесты на другие инфекции, передающиеся половым путем, такие как сифилис, хламидиоз и гонорея. При наличии этих инфекций легче заразиться ВИЧ-1.
 - Если вы считаете, что могли заразиться ВИЧ-1, сразу же сообщите об этом своему врачу. Он может назначить дополнительные тесты, чтобы убедиться, что статус ВИЧ-1 у вас по-прежнему отрицательный.
 - Обратитесь за информацией и поддержкой, чтобы уменьшить риск при половых контактах.
 - Не пропускайте ни одной инъекции препарата APRETUDE. Пропуск инъекций повышает риск заражения ВИЧ-1.
 - Если у вас обнаружат ВИЧ-1, вам нужно будет принимать другие препараты для лечения этой инфекции. Препарат APRETUDE не одобрен для лечения инфекции ВИЧ-1.

Если вы заражены ВИЧ-1 и применяете только APRETUDE, со временем вирус может стать устойчивым к лечению.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПАРАТЕ «APRETUDE»

APRETUDE — это рецептурный препарат, который применяется для доконтактной профилактики (ДКП) с целью снижения риска инфицирования вирусом иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1) у взрослых и подростков с массой тела не менее 35 кг (77 фунтов). Вирус иммунодефицита человека 1-го типа (ВИЧ-1) является возбудителем инфекции, которая может привести к развитию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Данные по безопасности и эффективности препарата APRETUDE у детей младше 12 лет или с массой тела менее 35 кг (77 фунтов) отсутствуют.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПРЕПАРАТ «APRETUDE» В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- **Если вы уже заражены ВИЧ-1.** Если у вас обнаружили ВИЧ-1, вам нужно принимать другие препараты для лечения инфекции ВИЧ-1. Препарат APRETUDE не одобрен для лечения инфекции ВИЧ-1.
- **Если вы не знаете, есть ли у вас ВИЧ-1.** Возможно, вы уже заражены ВИЧ-1. В таком случае вам нужно принимать другие препараты для лечения инфекции ВИЧ-1. Препарат APRETUDE позволяет снизить риск заражения ВИЧ-1, только если его применять **до** момента инфицирования.
- Если у вас аллергия на каботегравир.
- Если вы принимаете любой из следующих препаратов: карбамазепин, окскарбазепин, фенobarбитал, фенитоин, рифампин или рифапентин.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ «APRETUDE»

Сообщите своему врачу обо всех имеющихся у вас заболеваниях и других важных обстоятельствах, включая следующее:

- Была ли у вас когда-либо кожная сыпь или аллергическая реакция при применении препаратов, содержащих каботегравир.
- Есть ли у вас сейчас или были ли раньше проблемы с печенью.
- Были ли у вас когда-либо психические расстройства.
- Беременны ли вы или планируете ли забеременеть. Неизвестно, может ли APRETUDE нанести вред вашему будущему ребенку. APRETUDE может оставаться в организме до 12 месяцев с момента последней инъекции и даже дольше. Если вы забеременеете в период применения препарата APRETUDE или позже, сообщите об этом своему врачу.
- Кормите ли вы грудью или планируете ли это делать в будущем. APRETUDE может проникать в грудное молоко. Обсудите со своим врачом, как лучше кормить ребенка во время или после применения препарата APRETUDE.

Сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки. Некоторые лекарства могут взаимодействовать с препаратом APRETUDE. Составьте список принимаемых вами лекарств и показывайте его своему врачу и фармацевту при назначении нового препарата. Вы можете попросить своего врача или фармацевта предоставить вам список лекарств, взаимодействующих с препаратом APRETUDE.

Не начинайте принимать новое лекарство, не сообщив об этом своему врачу. Врач может сказать вам о том, безопасно ли применять препарат APRETUDE вместе с другими лекарствами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА «APRETUDE»

У препарата APRETUDE могут быть серьезные побочные эффекты, в том числе:

- **Аллергические реакции.** Если при применении препарата APRETUDE у вас появится сыпь, сразу же обратитесь к врачу. **Прекратите применение препарата APRETUDE и сразу же обратитесь за медицинской помощью при появлении сыпи в сочетании с любыми из следующих признаков или симптомов:** лихорадка; общее недомогание; утомляемость; боль в мышцах или суставах; затрудненное дыхание; волдыри или язвочки во рту; волдыри на коже; покраснение или отеки глаз; отеки во рту, отеки лица, губ или языка.
- **Проблемы с печенью.** Проблемы с печенью возникали как при наличии, так и при отсутствии в прошлом проблем с печенью или других факторов риска. Ваш врач может назначать вам анализы крови для оценки функции печени.

Сразу же обратитесь к своему врачу, если заметите у себя какой-либо из следующих признаков или симптомов, указывающих на проблемы с печенью: пожелтение кожи или белков глаз (желтуха); темная моча (цвета крепкого чая); светлый стул; тошнота или рвота; потеря аппетита; боль, ноющие или болезненные ощущения в правой части живота; зуд.

- **Депрессия или перепады настроения. Сразу же обратитесь к своему врачу или в отделение неотложной медицинской помощи при возникновении любого из следующих симптомов:** чувство печали или отчаяния; чувство тревоги или беспокойства; мысли о причинении себе вреда (суициде) или попытки причинения себе вреда.

Наиболее частые побочные эффекты препарата APRETUDE: боль, болезненные ощущения, уплотнение или шишка, отек, кровоподтек, покраснение, зуд, ощущение тепла, потеря чувствительности, абсцесс или изменение цвета кожи в месте инъекции; диарея; головная боль; лихорадка; утомляемость; проблемы со сном; тошнота; головокружение; метеоризм; боль в животе; рвота; боли в мышцах; сыпь; потеря аппетита; сонливость; боли в спине; инфекция верхних дыхательных путей.

Это не все возможные побочные эффекты препарата APRETUDE.

За медицинскими рекомендациями по поводу побочных эффектов обращайтесь к своему врачу. Вы можете сообщить о побочных эффектах в Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) по телефону 1-800-FDA-1088.

ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

- Побеседуйте со своим врачом или фармацевтом.
- Посетите веб-сайт [APRETUDE.com](https://www.apretude.com) или позвоните по телефону 1-877-844-8872, чтобы получить официальную информацию о препарате, утвержденную FDA.

September 2024 APR:4PIL

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2025 ViiV Healthcare or licensor.

PMUS-CBTBRFS240003_RUSS January 2025 Produced in USA. 0002-0035-01